

## AKUT OTITIS MEDIA (AOM) | Anbefaling vedrørende diagnostik og behandling

### Et eller flere symptomer på AOM

- Øresmerter
- Utilpashed, irriterabilitet og søvnproblemer
- Feber ( $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$ )
- Øreflåd

### Otoskopi

Nedsat bevægelighed af trommehinden

### Tympanometri

Normal bevægelighed af trommehinden

AOM er sandsynlig

✓ Overvej anden diagnose

Alment påvirket (med eller uden øreflåd)

Nej

Alder < 2 år med dobbeltsidig infektion

Ja

Ja


Nej

✓ Tilbyd antibiotika  
✓ Smertestillende behandling

Protraheret forløb (> 3 dage)

✓ Se an **uden** antibiotika i op til 3 dage  
✓ Smertestillende behandling

## AKUT FARYNGO-TONSILLIT | Anbefaling vedrørende diagnostik og behandling




Centor-kriterier	Score
Feber (temperatur $\geq 38$ °C)	1
Tonsilbelægninger	1
Ømme, hævede lymfeknuder på halsen	1
Fravær af hoste	1

\* Antibiotika kan evt. ordineres uden forudgående strep A-test, specielt ved teenagere og unge voksne.

GAS = gruppe A-streptokokker

## AKUT RHINOSINUIT | Anbefaling vedrørende diagnostik og behandling



### Symptomer på akut rhinosinuit

Tilstoppet næse


Næseflåd (ofte purulent)

Smerter i ansigt/tænder

Hovedpine

Reduceret lugtesans

## PNEUMONI | Anbefaling vedrørende diagnostik og behandling



Pneumoni	
Symptomer	Objektive fund
Hoste (tør eller produktiv)	Alment påvirket
Træthed	Feber
Kulderystelser	Takypnø
Vejrtrækningsbesvær	Krepitation ved lungestetoskopi
Smerter ved inspiration	Dæmpning ved perkussion
	Saturation nedsat
	Hypotension
	Takykardi

\* CRP-målinger < 24 timer fra sygdomsdebut bør anvendes med forsigtighed