Dansk Lungemedicinsk Selskab &
Medicinfunktionen i Region Hovedstaden

17. februar 2021

DSAM's høringssvar vedrørende National Klinisk Retningslinje omhandlende seponering af og fortsat behandling med inhalationssteroid til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

DSAM takker for muligheden for at kommentere på ovenstående udkast.

DSAM finder det positivt, at der er lavet en grundig litteraturgennemgang på vigtige PICOs.

Vi finder også, at fokus på måling af EOS i kategoriseringen af patienterne virker som en nem og håndterbar metode, der kan udbredes og anvendes i almen praksis.

DSAM vil gerne i relation til PICO 4 og 5 bemærke, at vi ikke finder det realistisk at forvente en valid skelnen mellem moderat-svær exacerbation og pneumoni i en klinisk hverdag i almen praksis, hvor der ikke altid er nem adgang til billeddiagnostik, og hvor mange diagnoser må stilles på det kliniske skøn. Her er pneumoni som diagnose helt generelt en usikker størrelse. Undersøgelser fra Danmark har vist, at der generelt er en betydelig overdiagnosticering af pneumoni i almen praksis. I en undersøgelse havde f.eks. kun omkring 10 % af de patienter, der fik stillet diagnosen i almen praksis, ved efterfølgende undersøgelser reelt en pneumoni.[1]

Det virker måske lidt overambitiøst at skelne mellem disse to tilstande i retningslinjen, uden i det mindste at medtage en diagnostik-variabel eller i det mindste en diskussion af, hvilke kriterier der ligger til grund for pneumonidiagnosen i hvilke studier. Specielt da det er lige her, at vi skal overveje at anbefale pt. at stoppe/hhv. fortsætte ICS. Nogle exacerbationer vil være kodet som pneumonier og vice versa i almen praksis, nogle vil være kodet for begge dele.

Stockholmsgade 55
2100 København Ø

T: 7070 7431
dsam@dsam.dk
www.dsam.dk

[1] Holm A, Pedersen SS, Nexoe J, Obel N, Nielsen LP, Koldkjaer O, et al. Procalcitonin versus C-reactive protein for predicting pneumonia in adults with lower respiratory tract infection in primary care. Br J Gen Pract 2007 Jul;57(540):555-60

En PICO eller to om diagnostiske tests ift. pneumoni hos KOL-patienter (i almen praksis) kunne have været en stor hjælp.

Med venlig hilsen

Anders Beich
Formand, DSAM