

Information om fosterdiagnostik

Genetisk rådgivning • Risikovurdering • Misdannelsesskanning

Kvindens alder og risiko for Downs syndrom i afrundede tal

Alder	20	25	30	35	40	45	50
Risiko	1:1600	1:1325	1:900	1:425	1:100	1:20	1:7

Risiko for Downs syndrom (odds) ved brug af nakkefoldskanning og double-test

Alder	Ved ugunstigt testsvar (højere end cut-off værdi)	Ved gunstigt testsvar (lavere end cut-off værdi)	Alder alene
15-19	1:25	1:6017	1:1551
20-24	1:25	1:5814	1:1435
25-29	1:25	1:5061	1:1172
30-34	1:23	1:3622	1:679
35-39	1:20	1:2114	1:259
>40	1:14	1:1200	1:72
Alle	1:21	1:3686	1:607

Let modificeret efter: Sundhedsstyrelsen. Retningslinjer for fosterdiagnostik. 2004.

Kombinationstest (nakkefold+doubletest(1.trim)): Gnstl. odds for at føde et barn med Downs syndrom, fordelt efter den gravides aldersgruppe. Anvendt cut-off=1:250.

Risiko for Downs syndrom (odds) ved brug af doubletest alene

Alder	Ved ugunstigt testsvar (højere end cut-off værdi)	Ved gunstigt testsvar (lavere end cut-off værdi)	Alder alene
15-19	1:65	1:3126	1:1551
20-24	1:65	1:2996	1:1435
25-29	1:62	1:2618	1:1172
30-34	1:57	1:1913	1:679
35-39	1:45	1:1181	1:259
>40	1:28	1:757	1:72
Alle	1:49	1:2045	1:607

Let modificeret efter: Sundhedsstyrelsen. Retningslinjer for fosterdiagnostik. 2004.

Doubletest (1.trim): Gnstl. odds for at føde et barn med Downs syndrom, fordelt efter den gravides aldersgruppe og testresultat. Anvendt cut-off=1:250.

