Høringssvar til DSAM-vejledningen ”Stress, angst og depression hos voksne: udredning og behandling” (deadline 5. november 2026)

Fra: Styrelsen for Patientsikkerhed

Afsnit og sidetal	Feedback/kommentarer	Forbeholdt DSAM
Vurdering af selvmordsrisiko s. 20	STPS foreslår det tydeliggøres, hvornår der bør foretages en systematisk vurdering af selvmordsrisiko, og hvad denne vurdering som minimum bør omfatte.	
Farmakologisk behandling, s. 45	Vi foreslår, at det præciseres, hvad der forstås ved ”svær stress” som behandlingsindikation i tabel 11. Det bør fremgå tydeligt, hvilken diagnosticeret tilstand den farmakologiske behandling retter sig imod, og at psykofarmakologisk behandling ikke iværksættes alene på baggrund af symptomscore eller betegnelsen ”stress”.	
Benzodiazepiner og Hypnotika, s. 45-6	Vi foreslår, at disse afsnit tydeligere kobles til SST gældende vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Det bør fremgå tydeligt, at der ved behandling med afhængighedsskabende lægemidler skal foretages en individuel vurdering af indikation, risici og foreligge en behandlingsplan med mål, forventet behandlingsvarighed og plan for opfølgning og revurdering.	